
VAS
1-3
-NSAIL,matamizol
Paracetamol
-tramadol/paracetamol
-tramadol
-adjuvanti
procjena i kompletna evaluacija pri svakom pregledu
PER OS
BRZO I KRATKO DJELUJUĆI ANALGETICI U FAZI TITRACIJE
4-6
• titrirati opioide
-tramadol 50mg
-morfin Cl 10mg
-oksikodon 10mg
• adjuvanti
-antidepresivi
-antiepileptici
procjena i evaluacija kroz 24 do 48 sati
7-10
• titrirati opioide
-morfin Cl 20mg (do 5x dnevno)
-oksikodon, hidromorfon
(50% povećanje dnevne doze u odnosu na prethodni dan)
• razmotriti uvođenje intramuskularnih opioida u bolusu
• adjuvanti
učestale evaluacije i prilagodbe s obzirom na klinički status
• definirati potrebnu dnevnu analgetsku dozu na osnovi titracije
• opetovano procijenjivati intenzitet boli jednodimenzionalnim upitnikom (VAS)
• procjeniti kvalitetu boli multidimenzionalnim upitnikom (McGill)
• svim pacijentima na opioidnoj terapiji odmah treba uvesti u svrhu prevencije laksative za regulaciju motiliteta crijeva i antiemetike
• procijeniti psihološki i socijalni status (BAI, BDI, QOL)
VAS
1-3
• konvertirati na sporootpuštajuće analgetike (na sat) uz obavezne dodatne kratko i brzo djelujuće analgetike za probijajuću bol
• nastaviti s adjuvantnim analgeticima ili po potrebi uvesti nove
• kontinuirano prevenirati nuspojave
• pružiti psihološku i socijalnu pomoć
• educirati
• opetovano procjenjivati intenzitet boli (VAS) i kvalitetu boli (McGill)
• kod dugotrajne per os primjene opioidnih analgetika ili kod iznenadne pojave nuspojava razmotriti konverziju u ekvianalgetsku dozu transdermalnih naljepaka
-fentanyl
-buprenorfin
4-6
• nastaviti titrirati dnevnu dozu sporootpuštajućim analgeticima
• obavezne doze kratko i brzo djelujućeg analgetika
• razmotriti specifične karakteristike boli
• nastaviti psihološku podršku
kompletna evaluacija kroz 24 do 48 sati
7-10
• nastaviti titrirati dnevnu dozu sporootpuštajućim analgeticima
•obavezne su doze kratko i brzo djelujućeg analgetika
• razmotriti specifične karakteristike boli
• nastaviti psihološku podršku
kompletna evaluacija kroz 24 sata