

# SPICT™ - Alat za indikatore suportivne i palijativne skrbi

**SPICT™ je vodič za prepoznavanje osoba s povećanim rizikom od pogoršanja zdravlja te smrti.**

**Utvrdite kod tih osoba nepodmirene potrebe za suportivnom i palijativnom skrbi.**

## Potražite dva ili više općih indikatora pogoršanja zdravlja.

- Izvedbeni status je loš ili u pogoršanju (osoba provodi u krevetu ili stolici više od 50% vremena tokom dana); reverzibilnost je ograničena.
- Zbog fizičkih i/ili mentalnih zdravstvenih problema je ovisan o tuđoj pomoći kod većine svojih potreba za skrbi
- Dvije ili više neplaniranih hospitalizacija u posljednjih 6 mjeseci.
- Gubitak težine (5 - 10%) u posljednjih 3-6 mjeseci i/ili nizak indeks tjelesne mase
- Uporni, teški simptomi unatoč optimalnom liječenju uzročnih stanja.
- Pacijent zahtjeva suportivnu i palijativnu skrb, ili pak prekid liječenja.

## Potražite kliničke indikatore jednog ili više uznapredovalih stanja

<b>Maligna bolest</b> Funkcionalna sposobnost pogoršava se zbog progresivnog metastatskog karcinoma. Preslab za onkološko liječenje, ili se liječenje svodi na kontrolu simptoma.	<b>Srčana/vaskularna bolest</b> NYHA III/IV kategorija srčane insuficijencije, ili ekstenzivna nelječiva bolest koronarnih arterija, uz: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dispneju ili grudnu bol u mirovanju ili u minimalnom naporu.</li></ul> Teška, inoperabilna bolest perifernih krvnih žila.	<b>Bubrežna bolest</b> 4. ili 5. stadij kronične bubrežne bolesti (eGFR <30ml/min) s pogoršanjem zdravlja. Zatajenje bubrega koje komplikira druga stanja koja skraćuju životni vijek, ili pak komplikira liječenje. Prestanak dijaliziranja.
<b>Demencija/krhkost</b> Ne može se oblačiti, hodati ili jesti bez pomoći. Želi manje jesti i piti; poteškoće u održavanju ishranjenosti. <b>Urinarna i fekalna inkontinencija</b> Više ne može verbalno komunicirati; oskudne socijalne interakcije. <b>Prijelom bedrene kosti;</b> više padova. <b>Rekurentne febrilne epizode ili infekcije;</b> aspiracijska pneumonija.	<b>Respiratorna bolest</b> Teška kronična bolest pluća sa: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dispnejom u mirovanju ili kod minimalnog napora između egzacerbacija.</li></ul> Potreba dugotrajne terapije kisikom. Potreba ventilacije zbog respiratornog zatajenja, ili je ventilacija kontraindicirana.	<b>Jetrena bolest</b> Uznapredovala ciroza s jednom ili više komplikacija u protekloj godini: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ascites otporan na diuretike</li><li>• Hepatička encefalopatija</li><li>• Hepatorenalni sindrom</li><li>• Baterijski peritonitis</li><li>• Rekurentna krvarenja iz varikoziteta.</li></ul> Transplantacija jetre je kontraindicirana.
<b>Neurološka bolest</b> Progresivno propadanje fizičkih i/ili kognitivnih funkcija usprkos optimalnoj terapiji. Smetnje govora sa sve većim teškoćama komuniciranja i/ili progresivnim smetnjama gutanja. <b>Rekurentna aspiracijska pneumonija;</b> dispnea ili respiratorna insuficijencija.	<b>Planiranje suportivne i palijativne skrbi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Revidirajte sadašnje tretmane i lijekove kako bi pacijent dobivao optimalnu skrb.</li><li>▪ Ako su simptomi ili potrebe kompleksni i teško rješivi, razmislite o upućivanju specijalistu za to područje.</li><li>▪ Usuglasite se s pacijentom i obitelji o sadašnjim i budućim ciljevima skrbi, te planu skrbi.</li><li>▪ Ako pacijentu prijeti gubitak sposobnosti, planirajte unaprijed.</li><li>▪ Zajlježite, komunicirajte i koordinirajte plan skrbi.</li></ul>	